

महिलाले प्रयोग गर्ने साधनहरू



पिल्स चक्की



आई.यु.सि.डी.



३ महिने सुई



महिला बन्ध्याकरण



इम्प्लान्ट



गर्भनिरोधक अस्थायी तथा स्थायी साधन सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ । थप जानकारीका लागि नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौ ।

गर्भ जाँच गराउने समयमा नै स्वास्थ्यकर्मीसँग सुत्केरी पश्चात् प्रयोग गर्ने गर्भनिरोधक साधनबारे परामर्श लिई अग्रिम निर्णय गरेमा सुत्केरी हुनेबित्तिकै गर्भनिरोधक साधनहरू प्रयोग गर्न सहज हुन्छ । साथै सुत्केरी पश्चात् पनि स्वास्थ्यकर्मीसँग गर्भनिरोधक साधन प्रयोगबारे परामर्श लिन सकिनेछ ।



नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र
टेक्. काठमाडौ ।



www.nheicc.gov.np, info@nheicc.gov.np

www.youtube.com/c/nheiccnepal

www.facebook.com/nheicc.nepal

आ.व. २०८०/०८१

सुत्केरी पश्चात् परिवार योजना सम्बन्धी सन्देश



बच्चा जन्मएको लगत्तैदेखि पहिलो १२ महिनाभित्रको अवधिमा हुन सक्ने अनिच्छित गर्भ रोक्न र उचित गर्भान्तर कायम गर्न उपयुक्त गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्नु नै सुत्केरीपछिको परिवार योजना सेवा हो ।

बच्चा जन्मएको कम्तीमा २ वर्ष गर्भान्तर नपुगी पुनः गर्भ रहेमा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

सुत्केरी भएको करीब एक महिनापछि वा महिनावारी नफर्कदै गर्भनिरोधक साधनहरूको प्रयोग बिना यौन सम्पर्क भएमा गर्भ रहन सक्छ । त्यसैले महिनावारी नफर्किएता पनि गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

बच्चा जन्मिएपछि एक वर्षको अवधिमा सुत्केरी महिलाहरूले आफ्नो र शिशुको स्वास्थ्यका लागि धेरै कुराहरूमा ध्यान पुऱ्याउनुपर्दछ। तीमध्ये आमा र शिशुको स्वास्थ्यका लागि २४ महिनाभन्दा कम अवधिको फरकमा गर्भ रहन नदिनु एक महत्वपूर्ण कुरा हो जसको लागि गर्भनिरोधक साधनहरू प्रयोग गरेर आमा र बच्चालाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ।

सुत्केरी भएको २४ महिनाभन्दा अगाडिको समयमा पुनः गर्भवती भएमा जन्मिने शिशु सानो र कम तौल हुने, अनि समयभन्दा चाँडै जन्मिने, शारीरिक मानसिक वृद्धि राम्ररी नहुने जस्ता असरहरू देखिने गर्दछ र साथै आमाको स्वास्थ्यमा पनि रक्तअल्पता तथा प्रसव अवस्थामा जटिलता भएर आमाको मृत्यु समेत हुने समस्या देखिन सक्दछ। त्यसैले गर्भनिरोधक साधनहरूको प्रयोग गरी उचित गर्भान्तर कायम गर्नुपर्छ।

गर्भनिरोधक साधनहरूको प्रयोग गरेर कम्तीमा २ वर्ष गर्भान्तर कायम गर्न सकेमा यसले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सुधार गर्न मद्दत पुऱ्याउनुको साथै यसले महिलाहरूको शिक्षा, सशक्तीकरण र सर्वाङ्गीण विकास गर्न मद्दत पुऱ्याउँछ।

सुत्केरी अवस्थामा गर्भ निरोधकका साधनहरूको प्रयोगले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा कुनै हानि पुऱ्याउँदैन।

सुत्केरी पश्चात्को अवधिमा गर्भनिरोधकका साधन वा विधिहरू निम्न समयमा अपनाउन सकिन्छ :

कण्डम : सुत्केरी पश्चात् कुनै पनि समयमा

इम्प्लाण्ट : सुत्केरी पश्चात् कुनै पनि समयमा

तीन महिने सुई : सुत्केरी भएको ६ हप्तापछि

पिल्स : स्तनपान नगराउनेको लागि सुत्केरी भएको ३ हप्तापछि र पूर्ण स्तनपान गराउनेको लागि सुत्केरी भएको ६ महिनापछि

आई.यु.सी.डी.: सुत्केरी भएको ४८ घण्टाभित्र वा सुत्केरी भएको ४ हप्तापछि

आकस्मिक गर्भनिरोधक साधन : सुत्केरी भएको ४ हप्तापछि गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग बिना यौन सम्पर्क रहेमा, यौन सम्पर्क भएको जति सक्दो चाँडो १२० घण्टाभित्र।

स्थायी वन्ध्याकरण :

पुरुषको लागि: कुनै पनि समयमा

महिलाको लागि: सुत्केरी भएको १ हप्ताभित्र वा सुत्केरी भएको ६ हप्तापछि

पुरुषले प्रयोग गर्ने साधनहरू

